

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to contact all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: [facadm16@gmail.com](mailto:facadm16@gmail.com) to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.




# HIRSUTISME ET HYPERANDROGENIE

# INTRODUCTION


- **L'hyperandrogénie**: ensemble des signes cliniques et/ou biologiques secondaires à une **imprégnation excessive en androgènes actifs chez la femme**, dont la principale manifestation clinique est **l'hirsutisme**.
- **Hirsutisme** :
  - Défini par l'existence chez une femme, d'un excès de pilosité faciale et corporelle de topographie **masculine**.
  - Deux origines sont possibles:
    - Une **hyper production** d'androgènes.
    - Une **hyper sensibilité** du follicule pilo-sébacé aux androgènes (**taux normaux**).

# RAPPELS PHYSIOLOGIQUES

- Chez la femme, les androgènes sont produits par :
  - ⇒ synthèse : corticosurrénales, ovaires,
  - ⇒ ou par conversion périphérique (foie, T. adipeux, peau).




- Ovaires et surrénales:
  - $\Delta^4$  Androstènedione et DHEA et son sulfate (SDHEA) +++: précurseurs à faible action.
  - La testostérone et la dihydrotestostérone (DHT): seuls androgènes actifs.
  - Mêmes systèmes enzymatiques et même intermédiaire, la prégnénolone.



Surrénales

Ovaires


La majorité de  
la **testostérone**  
provient  
de la **conversion** de la  **$\Delta^4$** .



- Transport de la testostérone: **TeBG (SHBG)** + albumine + libre: active (2%)
- Dans les tissus cibles, la **testostérone** agit sous sa forme initiale ou le plus souvent, est préalablement réduite en **DHT** / **5 $\alpha$  réductase**

### Tissus cibles des androgènes:

- Peau /follicules pilosébacés
- Musculature (morphotype androïde)
- Tissu adipeux
- OGE (clitoris/grandes lèvres)
- Voix (rauque)
- Os et cartilages
- SNC



5 $\alpha$ -R: 5 $\alpha$  réductase

DHT : Dihydrotestostérone

R : récepteur cytosolique



## Mode d'action des androgènes



# REGULATION DE LA SECRETION DES ANDROGENES FEMININS


## Surrénales

## Ovaires



# CLINIQUE

- L'hyperandrogénie (femme), peut affecter l'unité pilo-sébacée, l'ovulation et générer des T. métaboliques.




## Hirsutisme:

- Pilosité présente: visage, thorax, abdomen, ligne médiane, dos ... Les poils sont épais, longs et pigmentés.
- A différencier de l' hypertrichose : ↑ de la pilosité normale.
- Défini cliniquement/ score de Ferriman-Gallwey > 6
  - Subjectif
  - Semi-quantitatif.







**Score de Ferriman et Gallwey . Coter de 1 à 4 la présence et l'intensité de la pilosité.**



## Autres signes cutanés

- Acné, inflammatoire, sévère , à répartition masculine, au (-) 2 sites.
- Séborrhée.
- Epaissement peau.



## Troubles du cycle

- Spanio/aménorrhée, dys/anovulations

## Signes de virilisation

- Hypertrophie musculaire (morphotype androïde)
- Gols frontaux/alopecie
- Hypertrophie clitoridienne
- Voix rauque (masculine)
- Hypotrophie mammaire



## Signes associés (liés à la cause)

- Hypercorticisme, femme petite et trapue.
- HTA, acanthosis nigricans.



# BIOLOGIE

## Bilan d'hirsutisme

- > TSH
- > Prolactine
- > Testostérone totale
- > DHEAS
- > 17-OH progestérone
- > FSH, LH, estradiol (si aménorrhée)

# PRINCIPALES ETIOLOGIES

## Ovariennes

- Tumeurs ovariennes.
- SOPK+++ (80%)
- Hyperthécose.

## Surréaliennes

- Tumeurs surréaliennes.
- Hyperplasie congénitale des surrénales (1,4-4%)

## TABLEAU D' HYPERANDROGENIE

## Autres

- Maladie de Cushing
- Hyperprolactinémie

Hypersensibilité aux  
androgènes (8%)

### Causes:

>90% production

- ovaires
- surrénales

<10% sensibilité ?

N Engl J Med 2005;353:2578-88.

L'interrogatoire est primordial pour l'enquête étiologique:

En premier lieu, éliminer les causes médicamenteuses:

- Prise de stéroïdes anabolisants
- Progestatifs de synthèse ayant des effets androgéniques
- Certains neurotropes comme acide valproïque


Cas similaires dans la famille, consanguinité parentale, âge de la puberté, âge de début (péri pubertaire ou à distance) et mode d'évolution des symptômes (aigu ou chronique), troubles des règles et leur ancienneté, hypofertilité...

Un hirsutisme para-pubertaire, d'évolution lente, évoque une cause fonctionnelle. En revanche, un hirsutisme récent et explosif fait craindre une origine tumorale.



# Syndrome des Ovaires Polykystiques:

- 80 % des causes des hyperandrogénies.
- Femmes jeunes (5 à 10 %). Adolescentes (20-25 %).
- Maladie multigénique et multifactorielle.
- Arrêt de de la maturation folliculaire.




## Clinique:

- Début pubertaire ; peu évolutif et d'intensité variable.
- Hyperandrogénie + T. des règles, anovulation et infertilité. Avec un risque accru de Sd métabolique, particulièrement pour les obèses.

**Critères diagnostiques:**  $\exists$ ce de 2 des 3 critères de Rotterdam :


1. Oligo et/ou anovulation chronique.
2. Hyperandrogénie clinique et/ou biologique.
3. V3 ovaire  $> 10$  ml et/ou  $\exists$ ce  $\geq 12$  follicules de 2 à 9 mm/ ovaire.

**Testostérone:** 0,6 à 1,5 ng/ml.






# HISTOIRE NATURELLE DU SOPMK



# Tumeurs ovariennes :

- Arrhénoblastome Gonadoblastome
- **Signes cliniques:**
  - Début récent, explosif
  - Hyperandrogénie marquée avec signes de virilisation
  - Tr du cycle
- **testostérone** > 1,2 ng/ml . Delta 4 ↑↑
- **Echographie:** ovaires multifolliculaires  
IRM . T ovarienne ou cathétérisme des veines ovariennes




IRM: Tumeur ovarienne

## Hyperthécose ovarienne (Hyperplasie bénigne mais intense du stroma de la théque):

- Même tableau que les Tm ovariennes.
- Les OeP freinent l'hyperandrogénie ovarienne.
- Au cathétérisme veineux: hypersécrétion des deux ovaires.

# Hyperplasie congénitale des surrénales:

- Pathologies génétiques II à un déficit d'une enzymes de la stéroïdogénèse
- Transmission autosomique récessive.
- Le déficit en 21-hydroxylase (90%).  
11  $\beta$  OHase, 3  $\beta$  hydroxydéshydrogénase
- Hyperandrogénie  $\pm$  Déficit en cortisol et aldostérone .



## Formes classiques (complètes):

- **Ambiguïté sexuelle** à la naissance chez les filles .
- Garçon: il peut exister une hypertrophie pénienne .
- Il peut exister un **syndrome de perte de sel** à la naissance par déficit en aldostérone : DSH majeure.
- Dans les deux sexes: le + souvent, **puberté précoce** + accélération de la croissance, soudure précoce des cartilages et une **petite taille définitive**.

### Dosage 17 OH P

#### • Taux de base:

- > 5 ng/ml (15mM): Dg certain
- 2-5 ng/ml: Faire test au synacthène

## Formes à révélation tardive :

Les formes mineures (non classiques ) n'expriment qu'un déficit minime en cortisol et une hyperandrogénie révélée dans l'enfance ou à l'âge adulte

- Antécédents familiaux
- Début dans l'enfance ou péri-pubertaire
- Age osseux avancé avec une puberté précoce.
- Ménarchie tardive avec hirsutisme et troubles menstruels.
- Morphotype évocateur (léger virilisme, petite taille), parfois hypertrophie clitoridienne.


- 17 OHP de base normaux , élevés  $> 10$  ng/ml après SO.
- Hyperandrogénie modérée : Testo subnormale.
- La freination à DXM normalise les androgènes



# Tumeurs surrénaliennes:

## Corticosurrénalome malin:

- Tumeurs très rares, agressives.
- Femmes d'âge jeune.
- Début récent, **évolution explosive**.
- Hyperandrogénie marquée/**virilisation sévère**.
- Hypercorticisme, troubles du cycles.
- **Testostérone > 1,5 ng/ml.**
- **SDHEA > 20 µg/ml.**
- TDM: tumeur hétérogène, volumineuse.



## Adénome surrénalien:

- Tumeurs bénignes.
- Hyperandrogénie svt modérée avec T. du cycle ± Hypercorticisme.
- Testostérone > 1,5 ng/ml.
- TDM des surrénales: tumeur homogène, taille moyenne.



# Autres causes :

## MALADIE DE CUSHING

- **Signes cliniques:**
  - Hyperandrogénie, tr du cycle
  - obésité avec répartition faciotronculaire des graisses
  - Buffalo-neck
  - Vergetures abdominales et thoraciques larges et pourpres
  - Fragilité cutanée et capillaire
  - Erythrose faciale
  - HTA
- **Echographie:** ovaires multifolliculaires
- **Diagnostic par dosage du CLU/24 heures**

## HYPERPROLACTINEMIES

- oligoanovulation avec spanioménorrhée/aménorrhée
- galactorrhée
- Hyperandrogénie modérée surrénalienne (SDHEA)
- Echographie: ovaires multifolliculaires
- Dosage de PRL

- **DYSTHYROIDIE:** essentiellement hypothyroïdie responsable de prise de poids et troubles du cycle




# Hirsutisme Idiopathique:

= Augmentation de la sensibilité des récepteurs du follicule pileux aux androgènes dont la sécrétion est normale.

- Hirsutisme **modéré, isolé** sans troubles du cycle.
- **Début précoce** à la puberté ou quelques années plus tard
- **Évolution lente**
- Contexte familial et ethnique.
- **Testostérone et delta-4 normaux**.
- Un taux d'élimination urinaire de 3 alpha androstanediol: élevé (= ↑ de l'activité de 5  $\alpha$  réductase).



## Testostérone plasmatique $\pm \Delta 4$ • 17 OH-P après synacthène



La Revue du Praticien Gynécologie et Obstétrique, 15 octobre 2000, n° 46

# TRAITEMENT

- Il sera chirurgical pour les **tumeurs** et médical dans les autres cas.

## Hyperplasie congénitale des surrénales :

- **Précoces** : traitement freinateur des androgènes par hydrocortisone ou dexaméthazone.
- **Tardives** : la prescription de dexaméthasone (0,5 - 1 mg/j) est d'usage. Certains préconisent l'utilisation d'anti-androgènes : Androcur.

## Syndrome des ovaires polykystiques :

### Mesures cosmétiques:

- Décoloration, épilation électrique ou au laser
- Acné: traitement local
- Prescrit les premiers mois en attendant l'effet du traitement médical

## Traitement médical:

Le choix dépendra de l'âge et de la demande de la patiente:

### Troubles du cycle:

- Pilule EP
- Progestatif avec séquence de 12 à 14 jours par mois.

### Hirsutisme:

- Traitement cosmétique
- Association d'un antiandrogène de référence: l'acétate de cyproterone ( ANDROCUR ) et un œstrogène selon ≠ protocoles.

Androcur est un progestatif antigonadotrope puissant et un anti-androgénique.

Une prise 20 à 21 jours /mois + un 17  $\beta$  œstradiol (voie orale, patch ou gel) pour éviter l'atrophie endométriale.

Efficacité en 3 à 6 mois sur l'acné et en 6 mois sur l'hirsutisme.

**Si désire de grossesse:** Citrate de clomifène (clomid): inducteur de l'ovulation (2 cp/j de J3-J7) associé à un œstrogène de J3-J12. Surveillance attentive d'une éventuelle hyperstimulation ovarienne avec risque de rupture. Risque également de grossesses multiples.



# CONCLUSION

- Les hyperandrogénies sont souvent révélées par un hirsutisme, motif fréquent de consultation.
- Quelques éléments cliniques et biologiques simples permettent de faire le tri entre ce qui n'est qu'une variante de la normale, un dérèglement fonctionnel ovarien et/ou surrénalien et enfin une tumeur androgéno-sécrétante, heureusement assez rare.
- Le mode d'installation de l'hirsutisme est capital : apparu en période pubertaire, d'évolution lente, il évoque une cause fonctionnelle. Récent et explosif il fait craindre une tumeur.

- Toute hyperandrogénie clinique nécessite un bilan hormonal limité en 1<sup>ère</sup> intention au dosage de la testostérone, SDHEA et 17-OHP.
- Parmi les causes d'hyperandrogénie, la dystrophie ovarienne polykystique est de loin la plus fréquente. Elle est source d'hyperandrogénie, troubles du cycle et infertilité chez les femmes jeunes et s'associe à un risque métabolique et CV accru au long terme.
- Le traitement symptomatique repose sur les contraceptions OeP et surtout l'acétate de cyprotérone. Un traitement esthétique (décoloration, laser) associé au traitement médical, est souvent utile.

